$U_2Mn_3Si_5$ Structure: A3B5C2_tP40_128_dh_egh_h-001

Cite this page as: H. Eckert, S. Divilov, A. Zettel, M. J. Mehl, D. Hicks, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 4*. In preparation.

https://aflow.org/p/P4UA

https://aflow.org/p/A3B5C2_tP40_128_dh_egh_h-001



Prototype	$Mn_3Si_5U_2$
AFLOW prototype label	A3B5C2_tP40_128_dh_egh_h-001
ICSD	20929
Pearson symbol	tP40
Space group number	128
Space group symbol	$P4/mnc$
AFLOW prototype command	`aflow --proto=A3B5C2_tP40_128_dh_egh_h-001 --params=`$a, c/a, z_2, x_3, x_4, y_4, x_5, y_5, x_6, y_6$

Other compounds with this structure

$Ce_2Co_3Si_5$, $Ce_2Ni_3Si_5$, $Ce_2Ru_3Ga_5$, $Dy_2Ni_3Si_5$, $Dy_2Ru_3Ge_5$, $Dy_2Ru_3Si_5$, $Er_2Mn_3Si_5$, $Gd_2Re_3Si_5$, $La_2Ru_3Ga_5$, $Lu_2Fe_3Si_5$, $Lu_2Ru_3Si_5$, $Nd_2Os_3Ga_5$, $Nd_2Ru_3Ga_5$, $Np_2Re_3Ga_5$, $Pr_2Ru_3Ga_5$, $Pr_2Ru_3Ge_5$, $Pu_2Fe_3Ga_5$, $Pu_2Re_3Ga_5$, $Pu_2Tc_3Ga_5$, $Rb_2Os_3Si_5$, $Sc_2Fe_3Si_5$, $Sm_2Ru_3Ga_5$, $Sm_2Ru_3Ge_5$, $Tb_2Mn_3Si_5$, $U_2Tc_3Ga_5$, $Y_2Ni_3Si_5$

- Some authors refer to this as the $Sc_2Fe_3Si_5$ type.

Simple Tetragonal primitive vectors

$$\mathbf{a_1} = a\,\hat{\mathbf{x}}$$
$$\mathbf{a_2} = a\,\hat{\mathbf{y}}$$
$$\mathbf{a_3} = c\,\hat{\mathbf{z}}$$



Basis vectors

		Lattice coordinates		Cartesian coordinates	Wyckoff position	Atom type
$\mathbf{B_1}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(4d)	Mn I
$\mathbf{B_2}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(4d)	Mn I
$\mathbf{B_3}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(4d)	Mn I
$\mathbf{B_4}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(4d)	Mn I
$\mathbf{B_5}$	=	$z_2\,\mathbf{a}_3$	=	$cz_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Si I
$\mathbf{B_6}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 - \left(z_2 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} - c\left(z_2 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Si I
$\mathbf{B_7}$	=	$-z_2\,\mathbf{a}_3$	=	$-cz_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Si I
$\mathbf{B_8}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \left(z_2 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + c\left(z_2 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Si I
$\mathbf{B_9}$	=	$x_3\,\mathbf{a}_1 + \left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$ax_3\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{10}}$	=	$-x_3\,\mathbf{a}_1 - \left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$-ax_3\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{11}}$	=	$-\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + x_3\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + ax_3\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{12}}$	=	$\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - x_3\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - ax_3\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{13}}$	=	$-x_3\,\mathbf{a}_1 - \left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$-ax_3\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{14}}$	=	$x_3\,\mathbf{a}_1 + \left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$ax_3\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{15}}$	=	$\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - x_3\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - ax_3\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{16}}$	=	$-\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + x_3\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + ax_3\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8g)	Si II
$\mathbf{B_{17}}$	=	$x_4\,\mathbf{a}_1 + y_4\,\mathbf{a}_2$	=	$ax_4\,\hat{\mathbf{x}} + ay_4\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{18}}$	=	$-x_4\,\mathbf{a}_1 - y_4\,\mathbf{a}_2$	=	$-ax_4\,\hat{\mathbf{x}} - ay_4\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{19}}$	=	$-y_4\,\mathbf{a}_1 + x_4\,\mathbf{a}_2$	=	$-ay_4\,\hat{\mathbf{x}} + ax_4\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{20}}$	=	$y_4\,\mathbf{a}_1 - x_4\,\mathbf{a}_2$	=	$ay_4\,\hat{\mathbf{x}} - ax_4\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{21}}$	=	$-\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(y_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(y_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{22}}$	=	$\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(y_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(y_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{23}}$	=	$\left(y_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(y_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{24}}$	=	$-\left(y_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(y_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Mn II
$\mathbf{B_{25}}$	=	$x_5\,\mathbf{a}_1 + y_5\,\mathbf{a}_2$	=	$ax_5\,\hat{\mathbf{x}} + ay_5\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Si III
$\mathbf{B_{26}}$	=	$-x_5\,\mathbf{a}_1 - y_5\,\mathbf{a}_2$	=	$-ax_5\,\hat{\mathbf{x}} - ay_5\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Si III
$\mathbf{B_{27}}$	=	$-y_5\,\mathbf{a}_1 + x_5\,\mathbf{a}_2$	=	$-ay_5\,\hat{\mathbf{x}} + ax_5\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Si III

$\mathbf{B_{28}}$	=	$y_5\,\mathbf{a}_1 - x_5\,\mathbf{a}_2$	=	$ay_5\,\hat{\mathbf{x}} - ax_5\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	Si III
$\mathbf{B_{29}}$	=	$-\left(x_5 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(y_5 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_5 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(y_5 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Si III
$\mathbf{B_{30}}$	=	$\left(x_5 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(y_5 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_5 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(y_5 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Si III
$\mathbf{B_{31}}$	=	$\left(y_5 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(x_5 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(y_5 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_5 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Si III
$\mathbf{B_{32}}$	=	$-\left(y_5 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(x_5 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(y_5 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_5 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	Si III
$\mathbf{B_{33}}$	=	$x_6\,\mathbf{a}_1 + y_6\,\mathbf{a}_2$	=	$ax_6\,\hat{\mathbf{x}} + ay_6\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	U I
$\mathbf{B_{34}}$	=	$-x_6\,\mathbf{a}_1 - y_6\,\mathbf{a}_2$	=	$-ax_6\,\hat{\mathbf{x}} - ay_6\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	U I
$\mathbf{B_{35}}$	=	$-y_6\,\mathbf{a}_1 + x_6\,\mathbf{a}_2$	=	$-ay_6\,\hat{\mathbf{x}} + ax_6\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	U I
$\mathbf{B_{36}}$	=	$y_6\,\mathbf{a}_1 - x_6\,\mathbf{a}_2$	=	$ay_6\,\hat{\mathbf{x}} - ax_6\,\hat{\mathbf{y}}$	(8h)	U I
$\mathbf{B_{37}}$	=	$-\left(x_6 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(y_6 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_6 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(y_6 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	U I
$\mathbf{B_{38}}$	=	$\left(x_6 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(y_6 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_6 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(y_6 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	U I
$\mathbf{B_{39}}$	=	$\left(y_6 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(x_6 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(y_6 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_6 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	U I
$\mathbf{B_{40}}$	=	$-\left(y_6 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(x_6 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(y_6 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_6 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(8h)	U I

References

[1] Y. P. Yarmolyuk, L. G. Aksel'rud, and E. I. Gladyshevskii, *Crystal structure of the compound $U_2Mn_3Si_5$*, Sov. Phys. Crystallogr. **22**, 358–359 (1977).

Found in

[1] W. Jeitschko and M. Schlüter, *Rare Earth Ruthenium Gallides with the Ideal Composition Ln_2Ru3Ga_5 (Ln = La–Nd, Sm) crystallizing with U_2Mn3Si_5 (Sc_2Fe3Si_5) Type Structure*, Z. Anorganische und Allgemeine Chemie **636**, 1100–1105 (2010), doi:10.1002/zaac.200900530.