Ordoñezite ($ZnSb_2O_6$) Structure: A6B2C_tP18_136_fj_e_a-001

Cite this page as: H. Eckert, S. Divilov, A. Zettel, M. J. Mehl, D. Hicks, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 4*. In preparation.

https://aflow.org/p/8DHD

https://aflow.org/p/A6B2C_tP18_136_fj_e_a-001



Prototype	O_6Sb_2Zn
AFLOW prototype label	A6B2C_tP18_136_fj_e_a-001
Mineral name	ordoñezite
ICSD	96612
Pearson symbol	tP18
Space group number	136
Space group symbol	$P4_2/mnm$
AFLOW prototype command	`aflow --proto=A6B2C_tP18_136_fj_e_a-001 --params=`$a, c/a, z_2, x_3, x_4, z_4$

Other compounds with this structure
$FeTa_2O_6$, $RhLi_2F_6$, $TiLi_2F_6$

- The actual composition of the experimentally measured sample is $(Zn_{0.98}Fe_{0.02})Sb_2O_6$.

Simple Tetragonal primitive vectors

$$\mathbf{a_1} = a\,\hat{\mathbf{x}}$$
$$\mathbf{a_2} = a\,\hat{\mathbf{y}}$$
$$\mathbf{a_3} = c\,\hat{\mathbf{z}}$$



Basis vectors

		Lattice coordinates		Cartesian coordinates	Wyckoff position	Atom type
$\mathbf{B_1}$	=	0	=	0	(2a)	Zn I
$\mathbf{B_2}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(2a)	Zn I
$\mathbf{B_3}$	=	$z_2\,\mathbf{a}_3$	=	$cz_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Sb I
$\mathbf{B_4}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \left(z_2 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + c\left(z_2 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Sb I
$\mathbf{B_5}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 - \left(z_2 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} - c\left(z_2 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Sb I
$\mathbf{B_6}$	=	$-z_2\,\mathbf{a}_3$	=	$-cz_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(4e)	Sb I
$\mathbf{B_7}$	=	$x_3\,\mathbf{a}_1 + x_3\,\mathbf{a}_2$	=	$ax_3\,\hat{\mathbf{x}} + ax_3\,\hat{\mathbf{y}}$	(4f)	O I
$\mathbf{B_8}$	=	$-x_3\,\mathbf{a}_1 - x_3\,\mathbf{a}_2$	=	$-ax_3\,\hat{\mathbf{x}} - ax_3\,\hat{\mathbf{y}}$	(4f)	O I
$\mathbf{B_9}$	=	$-\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(4f)	O I
$\mathbf{B_{10}}$	=	$\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_3 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_3 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(4f)	O I
$\mathbf{B_{11}}$	=	$x_4\,\mathbf{a}_1 + x_4\,\mathbf{a}_2 + z_4\,\mathbf{a}_3$	=	$ax_4\,\hat{\mathbf{x}} + ax_4\,\hat{\mathbf{y}} + cz_4\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II
$\mathbf{B_{12}}$	=	$-x_4\,\mathbf{a}_1 - x_4\,\mathbf{a}_2 + z_4\,\mathbf{a}_3$	=	$-ax_4\,\hat{\mathbf{x}} - ax_4\,\hat{\mathbf{y}} + cz_4\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II
$\mathbf{B_{13}}$	=	$-\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \left(z_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + c\left(z_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II
$\mathbf{B_{14}}$	=	$\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 + \left(z_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} + c\left(z_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II
$\mathbf{B_{15}}$	=	$-\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 + \left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 - \left(z_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$-a\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} + a\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} - c\left(z_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II
$\mathbf{B_{16}}$	=	$\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_1 - \left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_2 - \left(z_4 - \frac{1}{2}\right)\,\mathbf{a}_3$	=	$a\left(x_4 + \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}} - a\left(x_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}} - c\left(z_4 - \frac{1}{2}\right)\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II
$\mathbf{B_{17}}$	=	$x_4\,\mathbf{a}_1 + x_4\,\mathbf{a}_2 - z_4\,\mathbf{a}_3$	=	$ax_4\,\hat{\mathbf{x}} + ax_4\,\hat{\mathbf{y}} - cz_4\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II
$\mathbf{B_{18}}$	=	$-x_4\,\mathbf{a}_1 - x_4\,\mathbf{a}_2 - z_4\,\mathbf{a}_3$	=	$-ax_4\,\hat{\mathbf{x}} - ax_4\,\hat{\mathbf{y}} - cz_4\,\hat{\mathbf{z}}$	(8j)	O II

References

[1] T. S. Ercit, E. E. Foord, and J. J. Fitzpatrick, *Ordoñezite from the Theodoso Soto Mine, Sapioris, Durango, Mexico: New Data and Structure Refinement*, Can. Mineral. **40**, 1207–1210 (2002), doi:10.2113/gscanmin.40.4.1207.

Found in

[1] R. T. Downs and M. Hall-Wallace, *The American Mineralogist Crystal Structure Database*, Am. Mineral. **88**, 247–250 (2003).